


- Biotypengruppen**
- temporäre und ganzjährig wasserführende Kleingewässer
  - Landreitgrasfluren
  - saure Arm- und Zwischenmoore (gehölzfrei)
  - Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
  - Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
  - Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
  - Frischwiesen, -weiden und Scherrasen
  - Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte
  - Grünlandbrachen und Staudenfluren frischer Standorte
  - Intensivgrasland
  - Moor- und Bruchwälder
  - Erlen-Eschen-Wälder; Auenwälder
  - Rotbuchenwälder
  - Rodungen; Schneisen; junge Aufforstungen
  - naturnahe Laubwälder
  - Laubholzforsten
  - Laubholzforsten mit Nadelholzanteil
  - Nadelholzforsten
  - Nadelholzforsten mit Laubholzanteil
  - extensiv genutzte Äcker
  - Siedlungsbiotope mit hohem Grünflächenanteil
  - Kanäle und Gräben
  - Alleen und Baumreihen

- temporäre und ganzjährig wasserführende Kleingewässer
- Moor- und Bruchwälder
- FFH-Gebiet Buchheide (Templiner Forst)\_DE 2947-301
- GSG-Grenze
- BR Schorfheide-Chorn (SC)



**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiet Buchheide (Templiner Forst)\_DE 2947-301**  
**Karte 2: Biotypen**

Maßstab: 1:5 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000 Normalausgabe  
 Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80  
 © GeoBasis-DE/IGS, 2012

Auftraggeber:  
 Landesamt für Umwelt Brandenburg  
 Seeburger Chaussee 2  
 14479 Potsdam, OT Groß Glienicke

Bearbeitung: enterra  
 Stand: 15.09.2017  
 Kartographie: LfU/Ö2

Auftraggeber:  
 enterra, Fischerstraße 3, 30167 Hannover  
 ÖKOLOG, Hof 30, 16547 Perle  
 IAG, Schwanenstraße 2a, 16554 Seddiner See