


- Biotypengruppen**
- Landreitgrasfluren
 - saure Arm- und Zwischenmoore (gehölzfrei)
 - saure Arm- und Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung); Feucht- und Moorheide
 - Basen- und Kalk-Zwischenmoore (gehölzfrei)
 - Basen- und Kalk-Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung)
 - Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
 - Feuchtwiesen nährstoffarmer Standorte
 - Frischwiesen, -weiden und Scherrasen
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren frischer Standorte
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren trockener Standorte
 - Sandtrockenrasen
 - Laubgebüsch; Feldgehölze
 - Moor- und Bruchwälder
 - Vorwälder
 - naturnahe Laubwälder
 - Laubholforsten
 - Laubholforsten mit Nadelholzanteil
 - Nadelholforsten
 - Nadelholforsten mit Laubholzanteil
 - Kanäle und Gräben
 - Alleen und Baumreihen
 - Verkehrsflächen
 - FFH-Gebiet Reiersdorf_DE 2947-303
 - GSG-Grenze BR Schorfheide-Chorin (SC)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

LfU
Landesamt für Umwelt

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Reiersdorf_DE 2947-303

Karte 2: Biotypen

0 100 200 300 400 Meter

Maßstab 1:5 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80
© GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber:
Landesamt für Umwelt Brandenburg
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Auftragnehmer:
enterra, Fischerstraße 3, 30167 Hannover
ÖKO-LOG, Hof 30, 16247 Parlow
laG, Schlunkendorfer Str. 2e, 14554 Seddiner See

Stand: 16.08.2017
Kartographie: LIU / ÖZ