


Abbildung 11: Waldzustand in der Eichen-Kiefern-Buchen-Zeit um 500 u. Z. (ursprüngliche Vegetation) [aus Rubin, M., Brande, A. & Zerbe, S. 2008]



- Gewässer (Schwielowsee, Fercher Bach)
 - Waldtypen auf reichen Standorten**
 - Querco-Carpinetum (Stieleichen-Hainbuchenwald)
 - Querco-Carpinetum stachyetosum (feuchter Stieleichen-Hainbuchenwald)
 - Pruno-Fraxinetum (Erlen-Eschenwald)
 - Waldtypen auf armen und mittleren Standorten**
 - Pinetum (Kiefernmischwald)
 - Pino-Quercetum (Kiefern-Traubeneichenwald)
 - Querco-Betuletum (trockener Stieleichen-Birkenwald)
 - Querco-Betuletum molinietosum (feuchter Stieleichen-Birkenwald)
 - Fago-Quercetum (Rotbuchen-Traubeneichenwald)
 - Betuletum pubescentis (Birkenbruchwald)
 - Alnetum (Erlenbruchwald)
 - Vegetation waldfreier Standorte**
 - Caricion (Großseggenried), Phragmition (Röhricht)
 - Eriophoro-Sphagnetum (Wollgras-Torfmoos-Moor)
- Gestaltung: M. Rubin 2007



Waldzustand (ursprüngliche Vegetation) in der Eichen-Kiefern-Buchen-Zeit um 500 u. Z.