

Die BDF Schenkenberg liegt in der Großlandschaft Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen im Raum der Brandenburgischen Havelniederung. An diesen Landschaftsraum grenzt im Nordosten das Lehniner Land. Die BDF liegt im unmittelbaren Randbereich des Rietzer Sees und ist durch eine Verwallung mit vorgelagertem Graben vom See getrennt. Auf der ausgegrenzten Fläche wurde eine Mächtigkeit der Torfdecke von 0,30 m bis 0,35 m ermittelt.

Kalkerdniedermoor aus Niedermoororf über Kalkmudde


**Bodenklasse:** K (Erd- und Mulmmoore)

**Bodentyp:** KV (Erdniedermoor)


**Bodensubtyp:** KVc (Kalkerdniedermoor)

**Substrattyp:** og-H//f-Fmk

**Bodenausgangsgestein:** Hn//Fmk (Niedermoororf// Kalkmudde)



5



\*Nach diesem Horizont wurde mittels Pürckhauer-Bohrung ein weiterer Horizont ermittelt: III eGr (132-160 cm)

Bodenansprache nach KA5, Ad-Hoc AG Boden, Hannover 2005

(Näser, Schmidt, LfU; Hierold et al., ZALF)