




- ### Reviere Vogelarten Anh. I VS-RL und weitere wertgebende Vogelarten
- Revierrmittelpunkte
 - BfK - Baumfalke (*Falco subbuteo*)
 - Bek - Bekassine (*Gallinago gallinago*)
 - DfR - Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
 - Eisv - Eisvogel (*Alcedo atthis*)
 - FAd - Fischadler (*Pandion haliaetus*)
 - GBr - Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
 - GRh - Graureiher (*Ardea cinerea*)
 - GTr - Großtrappe (*Otis tarda*)
 - GrA - Grauwammer (*Emberiza calandra*)
 - Hbl - Haubenlerche (*Galerida cristata*)
 - Hdl - Heiderleiche (*Lullula arborea*)
 - Kl - Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
 - KnE - Knäkente (*Anas querquedula*)
 - Kra - Kranich (*Grus grus*)
 - Msp - Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)
 - Nt - Neuntöter (*Lanius collurio*)
 - Otl - Ortolan (*Emberiza hortulana*)
 - RMI - Rotmilan (*Milvus milvus*)
 - RWh - Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
 - Rw - Raubwürger (*Lanius excubitor*)
 - SAd - Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
 - SMI - Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
 - Sgr - Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
 - Ssp - Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
 - Slk - Steinkauz (*Athene noctua*)
 - SuO - Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
 - Swk - Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)
 - TSh - Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
 - WK - Waldkauz (*Strix aluco*)
 - WSto - Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
 - WWh - Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
 - WaKo - Wachtelkönig (*Crex crex*)
 - We - Wendehals (*Jynx torquilla*)


Nachweisliche Großtrappe 1999 bis 2012 (Schwerpunkträume)

- gering (bis 5 Tiere pro Begehung)
- sehr häufig (bis 55 Tiere pro Begehung)

- ### Biotoptklassen - Linien
- Fließgewässer
 - Standgewässer (einschl. Uferbereiche)
 - Röhrichtgesellschaften
 - Gras- und Staudenfluren
 - Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen
 - Verkehrsanlagen und Sonderflächen

- ### Biotoptklassen - Flächen
- Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhrichte etc.)
 - anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren
 - Moore und Sümpfe
 - Gras- und Staudenfluren
 - Trockenrasen
 - Zwergstrauchheiden und Nadelgebüsche
 - Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen
 - Wälder
 - Forsten
 - Äcker
 - Biotope der Grün- und Freiflächen
 - Bebaute Gebiete
 - Verkehrsanlagen und Sonderflächen

SPA-Gebiet 2003 B auf DTK im Maßstab 1:10.000 angepasst 2013



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

Land Brandenburg, Europa, Natura 2000, Naturpark Westhavelland

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

SPA-Gebiet Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch, Belziger Landschaftswiesen

Teilgebiet B - Havelländisches Luch

Karte 4B_1: Reviere Vogelarten Anh. I VS-RL und weitere wertgebende Vogelarten

Maßstab 1:15.000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe, Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80, © GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Bearbeitung: Institut biota GmbH, Stand: 06.2013, Kartographie: LUGV / ÖZ